

SIGADE AAFRIKA KATK АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Veterinaar- ja Toiduamet
Väike-Paala 3, 11415 Tallinn
tel. 605 1710 / faks 621 1441
vet@vet.agri.ee
Lisainformatsioon: www.vet.agri.ee

MAAKONDADE VETERINAARSKESKUSED

Harjumaa Veterinaar keskus
Västriku 2b, 11312 Tallinn
Tel 6580420

Hiiumaa Veterinaar keskus
Hiiu mnt 3, 92101 Käina
Tel 46 22030

Ida-Virumaa Veterinaar keskus
Viru 5a, Jõhvi linn, 41589 Ida- Virumaa
Tel 33 66774

Jõgevamaa Veterinaar keskus
Ravila 10, 48306 Jõgeva
Tel 77 20201

Järvamaa Veterinaar keskus
Pärnu 58, 72712 Paide
Tel 3854520

Läänemaa Veterinaar keskus
Jaani 8, 90502 Haapsalu
Tel 47 24 791

Lääne-Virumaa Veterinaar keskus
Neffi 2, Piira
46607 Lääne-Virumaa
Tel 32 32050

Pärnumaa Veterinaar keskus
Haapsalu mnt 86, 80010 Pärnu
Tel 44 71614

Põlvamaa Veterinaar keskus
Puuri tee 1, 63308 Põlva
Tel 799 4413

Raplamaa Veterinaar keskus
Kuusiku tee 6, 79511 Rapla
Tel 48 92590

Saaremaa Veterinaar keskus
Kohtu 10, pk35
93802 Kuressaare
Faks 45 31 273

Tartumaa Veterinaar keskus
Vahi, Tartu vald 60511 Tartumaa
Tel 740 1208

Valgamaa Veterinaar keskus
Tartu mnt 79, 68205 Valga
Tel 76 66 712

Viljandi Veterinaar keskus
Vabaduse plats 4, I korrus
71020 Viljandi
Tel 435 0020

Võrumaa Veterinaar keskus
Võrumõisa tee 4
65555 Võru linn
Tel 78 24051

Ветеринарно-пищевой департамент
Вяйке-Паала 3, 1415 Таллинн
тел. 605 1710 / факс 621 1441
vet@vet.agri.ee
Дополнительная информация:
www.vet.agri.ee

УЕЗДНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЦЕНТРЫ

Ветеринарный центр Харьюмаа
Вястрику 2b, 11312 Таллинн
Тел 6580420

Ветеринарный центр Хийумаа
Хийу мнт 3, 92101 Кяйна
Тел 46 22030

Ветеринарный центр Ида-Вирумаа
Виру 5а, г. Йыхви,
41589 Ида-Вирумаа
Тел 33 66774

Ветеринарный центр Йыгевамаа
Равила 10, 48306 Йыгева
Тел 77 20201

Ветеринарный центр Ярвамаа
Пярну 58, 72712 Пайде
Тел 3854520

Ветеринарный центр Лянеммаа
Яани 8, 90502 Хаапсалу
Тел 47 24 791

Ветеринарный центр Ляэне-Вирумаа
Неффи 2, Пийра
46607 Ляэне-Вирумаа
Тел 32 32050

Ветеринарный центр Пярнумаа
Хаапсалу мнт 86, 80010 Пярну
Тел 44 71614

Ветеринарный центр Палвамаа
Пуру тее 1, 63308 Пылва
Тел 799 4413

Ветеринарный центр Рапламаа
Куузику тее 6, 79511 Рапла
Тел 48 92590

Ветеринарный центр Сааремаа
Кохту 10, п/я 35
93802 Куressaare
факс 45 31 273

Ветеринарный центр Тартумаа
Вахи, волость Тарту
60511 Тартумаа
Тел 740 1208

Ветеринарный центр Валгамаа
Тарту мнт 79, 68205 Валга
Тел 76 66 712

Ветеринарный центр Вильянди
Вабадусе платс 4, I этаж,
71020 Вильянди
Тел 435 0020

Ветеринарный центр Вырумаа
Вырумыйза тее 4,
65555 город Выру
Тел 78 24051

Sigade Aafrika katk (edaspidi SAK) on väga nakkuslik ning ägedalt kulgev nii kodu- kui metssigade viirushaigus, mis iseloomustub palaviku, verejooksu, põletikuliste muutustega mitmesugustes elundites ja suure suremusega (kuni 100% loomadest). SAKi ei haigestu inimesed ning ka teised loomaliigid, kuid nad võivad viirust edasi kanda. SAKi ravi ning vakstiin selle vastu puuduvad.

HAIGUSE LEVIK

Haigusetekiitaja levib otsesel kontaktil haige loomaga või tema eritistega. Sigade nakatumine võib toimuda ka kaudselt näiteks nakatunud loomadelt pärinevat liha sisaldava sööda või toidujäätmete söötmisel, haigusetekiitajaga saastunud sööda, joogivee, sõiduvahendite, sisseseade, joogivee, riiete vahendusel. Metssigade nakatumine toimub enamasti metsa viidud kodusigade korjuste, tapajäätmete või toidujäätmete vahendusel. Mõningates piirkondades levib haigus ka ruukide vahendusel, kuid Eestis vastavaid liike looduslikult ei leidu.

Viirus on väliskeskkonna tingimustele väga vastupidav, säilides:

- » külmutatud lihas mitu aastat;
- » soolatud lihas kuni 310 päeva;
- » suitsutatud lihas kuni 6 kuud;
- » mullas ja pinnases kauem kui 6 kuud;
- » loomakorjustel kuni 2 kuud;
- » viirus häviv kuumutamisel 70 °C.

Африканская чума свиней (АЧС) очень острозаразная и остро протекающая вирусная болезнь, как домашних, так и диких свиней, которая характеризуется температурой, кровотечением, воспалительными изменениями различных органов и высокой смертностью (100% животных). АЧС не заболевают люди и другие виды животных, но они могут быть переносчиками вируса. Лечение АЧС и вакцины не существует.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНИ

Возбудитель болезни распространяется непосредственно через контакт с больным животным или его выделениями. Заражение свиней может происходить и косвенно, например, при скармливании кормов или пищевых отходов, содержащих происходящее от зараженных животных мяса, посредством зараженного возбудителем болезни корма, питьевой воды, транспортных средств, внутреннего оборудования, питьевой воды и одежды. Заражение диких свиней происходит в основном посредством доставки в лес трупов домашних свиней, боенских отходов или пищевых отходов. В некоторых регионах болезнь распространяется и посредством клещей, но в Эстонии соответствующие виды в природе не обнаружены.

Вирус очень устойчив к условиям внешней среды, сохраняясь:

- » в замороженном мясе несколько лет;
- » в соленом мясе до 310 дней;
- » в копченом мясе до 6 месяцев;
- » в земле и на почве дольше, чем 6 месяцев;
- » в трупах животных до 2 месяцев;
- » вирус уничтожается нагреванием в 70 °C.

HAIGUSE KLIINILISED TUNNUSED

Haiguse peiteperiood on tavaliselt 3-15 päeva ning kliinilised tunnused on väga varieeruvad sõltuvalt viiruse patogeensusest. Praegusel ajal Venemaal ja Valgevenes laialdaselt levivale SAKile on iseloomulik haiguse üliäge vorm, mida iseloomustab sigade äkksurm ning muude haigustunnuste puudumine.

SAKI DIAGNOOSIMINE

SAKi kahtluse püstitab veterinaararst ja diagnoos pannakse laboratoorsete analüüside, kliiniliste tunnuste ja lahanguleiu alusel.

MIDA TEHA SAKI KAHTLUSE KORRAL?

Loomade haigestumisest või hukkumisest peab loomapidaja viivitamatult informeerima veterinaararsti. Loomaarsti või maakonna veterinaarikeskust tuleb informeerida ka kõikidest muudest sündmustest, mis võivad viidata SAKile.

Veterinaararsti saabumiseni on oluline vältida võimaliku nakkuse levikut. Selleks:

- » ära vii farmist välja elusloomi või korjuseid, inventari, sööta, joogivett, sõnnikut, allapanu ja teisi võimalikke nakkust edasikandvaid materjale ning jäätmeid;
- » takista kõrvaliste isikute sissepääsu farmi.
- » takista teiste loomade ja näriliste kokkupuudet elussigade või korjustega.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ

Скрытый период болезни составляет обычно 3-15 дней, и клинические симптомы сильно варьируются в зависимости от патогенности вируса. Для имеющего сейчас широкое распространение в России и Белоруссии АЧС характерна особенно острая форма болезни, которая характеризуется внезапной смертью свиней и отсутствие других симптомов болезни.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ АЧС

Подозрение на АЧС устанавливает ветеринарный врач, и диагноз ставится на основании лабораторных анализов, клинических симптомов и патологоанатомических данных.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ НАЛИЧИЯ АЧС?

О заболевании или падеже животных лицо, содержащее животных, должно незамедлительно проинформировать ветеринарного врача. Ветеринарного врача или уездный ветеринарный центр следует проинформировать и обо всех других событиях. Которые могут указывать на АЧС.

До прибытия ветеринарного врача важно избежать возможного распространения заражения. Для этого:

- » не выводить с фермы живых животных или выносить их трупы, инвентарь, корм, питьевую воду, навоз, подстилку и другие возможные материалы, которые могут распространять инфекцию или;
- » препятствовать доступу посторонних лиц на ферму;
- » препятствовать соприкосновению других животных и грызунов с живыми свиньями или трупами.

КУИДАS КАИТСТА ОМА ЛООМИ САКИ ЕЕСТ?

Kaitsmaks oma loomi nakatumise eest tuleb järgida vähemalt järgmisi bioohutusmeetmeid:

- » ära luba kõrvalisi isikuid loomapidamishoonesse;
- » enne loomapidamishoonesse sisenemist vaheta riided, desinfitseeri või vaheta jalanõud;
- » hoia karja juurde toodav loom karjasolevatest loomadest eraldi (karantiin);
- » hoia haige loom eraldi tervetest;
- » väldi viiruse pääsu loomapidamishoonesse sööda, allapanu või invetariiga;
- » ära sööda sigadele toidujäätmeid;
- » teosta näriliste tõrjet;
- » takista metsloomade ja teiste koduloomade pääsemist loomapidamishoonesse;
- » nõua nende bioohutusmeetmete täitmis kõigilt, kes sinu loomadega tegelevad.

MIDA TEHA, ET KAИТСТА METSSIGU NAKKUSE EEST?

Ära vii seakorjuseid ega muid loomseid saadusi loodusesse, kus metssead võivad neile liigi pääseda ja nakatuda.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИХ ЖИВОТНЫХ ОТ АЧС?

Для защиты своих животных от АЧС необходимо следовать, по меньшей мере, следующим мерам биобезопасности:

- » не допускать посторонних лиц в здание, где содержатся животные;
- » до того, как войти в здание, где содержатся животные, сменить одежду, продезинфицировать или сменить обувь;
- » держать доставленное в стадо животное отдельно от животных в стаде (карантин);
- » содержать больное животное отдельно от здоровых;
- » избегать проникновения вируса в здание, где содержатся животные с кормом, подстилкой или инвентарем;
- » не скармливать животным пищевые отходы;
- » провести уничтожение грызунов;
- » препятствовать проникновению диких животных и других домашних животных в здание, где содержатся животные;
- » требовать выполнения этих мер биобезопасности от всех, кто работает с твоими животными.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ДИКИХ СВИНЕЙ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?

Не относить трупы свиней и другие продукты животного происхождения в природные места, где они доступны для свиней.